

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Памятка KFM



Эффективное лечение трихофитии

Стригущий лишай КРС, например, негативно влияет на благополучие животных и результаты деятельности хозяйства, снижая надои молока. Основными составляющими лечения являются местная терапия, вакцинация, изоляция и гигиенические меры.

Внимание:

Лишай КРС является так называемым «зоонозом», он также передается человеку.

1. Местная терапия трихофитии

- Отдельных животных следует лечить местно с помощью противогрибковых препаратов, чтобы быстро снизить риск заражения. Для этого можно использовать мази, промывания или опрыскивание животных активным веществом.
- Для укрепления иммунной системы рекомендуется использовать кормовые добавки, содержащие витамин

2. Вакцинация как лечебная мера

- Вакцинация заболевших животных ускоряет процесс выздоровления, она целесообразна как для профилактики, так и для лечения трихофитии
- НО: только путем вакцинации и иммунизации всего поголовья животных можно успешно бороться с трихофитией/коровьим лишаем на длительный срок

3. Изоляция животных

- Больные животные, животные из того же отсека, а также недавно вакцинированные животные должны быть отделены от здоровых животных как минимум на 4 недели после второй вакцинации или заживления кожных поражений
- Также вначале необходимо изолировать животных, приобретенных у других поставщиков

4. Гигиенические меры при трихофитии

- Дополнение лечения отдельных животных местной терапией или изоляцией с принятием соответствующих сопутствующих гигиенических мер
- Регулярная очистка и дезинфекция помещений и оборудования

5. Вакцинация как профилактическая мера

- Медикаментозное лечение поголовья практически невозможно
- Локальная терапия направлена на животных, особенно сильно пораженных болезнью
- Долгосрочный эффект с выздоровлением животных и формированием иммунитета можно достичь только путем последовательной вакцинации животных против трихофитии
- В течение двух недель проводится двукратная вакцинация
- Примерно через 4 недели у животного формируется многолетний иммунитет

Прочитайте по этой теме также памятку KFM „[О предотвращении трихофитии](#)“.