

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Памятка KFM

Предотвратить распространение трихофитии!

Не все хозяйства затронуты этой инфекцией. Следующие советы и рекомендации помогут предотвратить распространение коровьего лишая.

Внимание:

Лишай КРС является так называемым «зоонозом», он также передается человеку.

Распространение грибка

- Возбудитель *Trichophyton verrucosum* любит повышенную влажность воздуха и теплый влажный климат в коровнике, а также предпочитает темноту. Тесные лежаки и места кормления, где животные теснятся, также способствуют распространению грибка.
- Здоровые животные с нормальной защитной функцией организма, а также хороший уход, оптимальное кормление и содержание животных предотвращают распространение трихофитии.

Какие меры в окружающей среде могут остановить трихофитию?

- Сухой климат в коровнике и регулярная хорошая вентиляция
- Обеспечьте животным как можно больше света, ультрафиолетовое излучение солнечного света убивает возбудителей
- Обеспечьте животным достаточно места за счет больших лежанок и кормушек
- Соблюдайте гигиену в коровнике, тщательно очищайте или заменяйте загрязненные щетки для ухода
- Регулярно очищайте и дезинфицируйте оборудование коровника
- Остатки корма и навоз являются рассадниками мух и других насекомых, которые переносят возбудителя лишая КРС, поэтому их необходимо регулярно удалять из коровника
- Последовательная борьба с насекомыми и вредителями во всем коровнике
- Ремонт поврежденного оборудования коровника, которое может повредить кожу острыми краями

Усиление иммунитета животных против трихофитии!

- Обеспечить здоровую и сильную иммунную систему животных
- Оптимальное кормление и обеспечение животных необходимыми питательными веществами
- Предотвращать дефицит витаминов и минералов, особенно дефицит витамина А, который повышает восприимчивость к инфекции
- Обращать внимание на нарушения обмена веществ и устранять их
- Обеспечить надлежащие условия содержания и избегать стресса
- В зимний период подстригать слишком длинную шерсть, следить за тем, чтобы шерсть не была влажной и не покрывалась коркой
- Предотвращать занос трихофитии в стадо с новыми животными
- Обязательно проводить профилактическую вакцинацию приобретенных животных!

Прочитайте на эту тему памятку KFM „[Лечение трихофитии](#)“.

Уве Веддиге & Айнагуль Аяганова

+7 7055955264

ainagul.ayaganova@adt.de