

Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Landwirtschaft, Ernährung  
und Heimat

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



## Памятка KFM

### Надлежащее хранение и применение ветеринарных препаратов (стр. 1)

**Медикаменты следует хранить всегда в прохладных, сухих и чистых помещениях**

- Соблюдайте предписания изготовителей на упаковке и во вкладыше.
- Порошкообразные средства после вскрытия упаковки следует защищать от тепла и влаги.
- Никогда не храните медикаменты в коровнике.
- Посторонние лица не должны иметь доступа к ветеринарным препаратам.



#### Вакцины и лекарства:

- Препараты с указанием хранения при температуре 2–8 °С следует хранить в холодильнике.
- Для проверки необходимо использовать термометр холодильника.

#### Открытые бутылки:

- Хранить всегда в холодильнике.
- Пометить дату вскрытия упаковки.
- По истечении срока годности, указанного производителем, после вскрытия упаковки лекарственные средства необходимо утилизировать.

#### Защита пользователей

- Кожа, слизистые оболочки и дыхательные пути персонала не должны контактировать с медикаментами.
- особую осторожность следует проявлять при использовании антибиотиков и медикаментов, которые могут всасываться через кожу (например, простагландины для стимуляции родов).

#### Документация:


- **Обязательно:** письменная или цифровая документация каждого лечения, чтобы избежать несоблюдения сроков ожидания для поставки молока или мяса.

Uwe Weddige & Ainagul Ayaganova +7 7055955264 [ainagul.ayaganova@adt.de](mailto:ainagul.ayaganova@adt.de)

## Надлежащее хранение и применение ветеринарных препаратов (стр. 2)

### Применение медикаментов

- Бутылки всегда прокалывать только чистыми канюлями,
- для вакцин и лекарств использовать отдельные шприцы или шприцы с пистолетной рукояткой (револьверные), оптимально использовать один шприц-ревовер на каждую вакцину,
- Флаконы с лекарствами, которые были установлены на револьвер для последовательной обработки, остаются в холодильнике со свежей канюлей до полного опорожнения.
- Регулярно проверяйте объем дозирования револьвера с помощью шкалы одноразового шприца.
- Используйте только чистые иглы, длина которых соответствует размеру животного и типу инъекции (подкожная, внутримышечная и т. д.).
- Диаметр зависит от размера животного и консистенции препарата (водная или маслянистая).
- Используйте только неповрежденные острые иглы без зазубрин на конце.



### В общем рекомендуется использование:

- одноразовых перчаток,
- при применении порошкообразных лекарств надевать защитную маску.

### Промывка шприцев и шприц-пистолетов

Инъекционные шприцы и пистолеты необходимо регулярно очищать. Более подробную информацию об этом вы найдете в памятке KFM [„О промывке шприцев и канюль“](#)