

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Памятка KFM

Спасаем телят с нарушением пищеварения!

На многих молочных фермах диарея у телят в первый месяц жизни животных по-прежнему является частой причиной смерти.

Описание проблемы: У телят, которые быстро и жадно пьют, молоко может попасть в рубец. Поступившее в рубец таким образом молоко начинает там бродить. Уровень pH в желудке резко падает, что приводит к болезненному раздражению слизистой оболочки желудка.

Теленок может переваривать молоко только в сычуге! Поэтому при сосании соска срабатывает так называемый глотательный рефлекс, благодаря которому молоко поступает мимо рубца прямо в сычуг.

Важнейшими признаками попадания молока в рубец являются следующие:

- отсутствие аппетита, неохотное питье и жевание соски поилки,
- скрежет зубами, имитация жвачки, покусывание предметов,
- сгорбленность, вздутие живота с левой стороны, физическая слабость,
- серый, глинистый кал и диарея,
- после перенесенной болезни часто наблюдается выпадение шерсти на голове или ногах.

Причиной быстрого, поспешного питья часто могут быть ошибки при выпойке:

- Не давайте слишком много молока за один раз, особенно молодым и маленьким животным.
- Давайте несколько раз по максимум 1,5 литра, чтобы молоко из сычуга не перетекло в рубец.
- Давайте только подогретое молоко, температурой около 38–40 °С.
- Кроме того, отверстие соски на ведре для выпойки не должно быть слишком большим.



Телята должны пить, слегка приподняв голову. Питье из открытых ведер всегда требует неестественной позы!

Больные телята нуждаются в скорейшем переходе на корм для растущего скота, хорошем сене и свежей воде, чтобы их рубцы могли восстановиться и хорошо развиваться.

Не забываем:

Взаимное сосание телят происходит значительно реже, если их сосательный рефлекс удовлетворен. Хорошим признаком этого является высокая выработка слюны во время питья.

Уве Веддиге & Айнагуль Аяганова

+7 7055955264

ainagul.ayaganova@adt.de